

## **Pakuotės lapelis: informacija vartotojui**

### **STODAL sirupas**

Homeopatinis vaistinis preparatas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
- Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

#### **Apie ką rašoma šiame lapelyje?**

1. Kas yra STODAL ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant STODAL
3. Kaip vartoti STODAL
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti STODAL
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

#### **1. Kas yra STODAL ir kam jis vartojamas**

STODAL yra skirtas kosuliui palengvinti.  
Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

#### **2. Kas žinotina prieš vartojant STODAL**

##### **STODAL vartoti negalima:**

- jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
- vaikams iki 2 metų.

##### **Įspėjimai ir atsargumo priemonės**

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti STODAL.

##### **Kiti vaistai ir STODAL**

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

##### **STODAL vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu**

Duomenų nėra.

##### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

##### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Duomenų nėra.

### **STODAL sudėtyje yra sacharozės, etanolio ir benzenkarboksirūgšties.**

Jeigu gydytojas jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Šio vaisto sudėtyje yra 1,74 tūrio % etanolio (alkoholio), t.y. iki 206 mg dozėje (15 ml sirupo) (atitinka 5,22 ml alaus, 2,18 ml vyno).

Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

Vienoje 5 ml dozėje yra 0,00537 g benzenkarboksirūgšties ir vienoje 15 ml dozėje yra 0.0161 g benzenkarboksirūgšties.

### **3. Kaip vartoti STODAL**

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

*Suaugusiems žmonėms ir paaugliams:* po 15 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą.

*Vaikų populiacija (nuo 2 iki 12 metų):* po 5 ml matavimo taurelę 3–5 kartus per parą.

Jei per savaitę kosulys nepalengvėja, būtina kreiptis į gydytoją!

#### **Ką daryti pavartojus per didelę STODAL dozę?**

Pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.

#### **Pamiršus pavartoti STODAL**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti STODAL**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **4. Galimas šalutinis poveikis**

Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nėra duomenų.

#### **Pranešimas apie šalutinį poveikį**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt) esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt), taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu <http://www.vvkt.lt>). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

### **5. Kaip laikyti STODAL**

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.  
Tinkamumo laikas po pirmo buteliuko atidarymo: 1 metai.

Ant dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

## 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

### STODAL sudėtis

- Veikliosios medžiagos 5 ml yra:

<i>Antimonium tartaricum</i>	6CH	59,375 mg
<i>Bryonia</i>	3CH	59,375 mg
<i>Coccus cacti</i>	3CH	59,375 mg
<i>Drosera</i>	TM	59,375 mg
<i>Ipeca</i>	3CH	59,375 mg
<i>Myocarde</i>	6CH	59,375 mg
<i>Pulsatilla</i>	6CH	59,375 mg
<i>Rumex crispus</i>	6CH	59,375 mg
<i>Spongia tosta</i>	3CH	59,375 mg
<i>Sticta pulmonaria</i>	3CH	59,375 mg

- Pagalbinės medžiagos yra *Tolu* sirupas, putokšlių sirupas, sacharozės tirpalas, etanolis (96 %), karamelė (E150a), benzoinė rūgštis (E210).

### STODAL išvaizda ir kiekis pakuotėje

Šviesiai geltonos-rudos spalvos, panašus į sirupą skystis.

Kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 200 ml sirupo, ir taurelė (gradacijos žymės: 5 ml ir 15 ml).

Kartono dėžutėje yra buteliukas, kuriame yra 200 ml sirupo, nuo lašėjimo apsaugantis piltuvėlis ir taurelė (gradacijos žymės: 5 ml ir 15 ml).

### Registruotojas ir gamintojas

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g.15, Sutkūnai

76104 Šiaulių raj.

Tel. +37080012345

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-04-23.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.