



Putojančius burbuliukus išskirianti žvakutė

Vidurius laisvinanti žvakutė suaugusiems
Vidurius laisvinanti žvakutė vaikams

Medicinos priemonė

Vidurius laisvinanti žvakutė, išskirianti putojančius burbuliukus.
Tiesiojoje žarnoje susikaupusių ir nepašalintų išmatų šalinimas fiziologiniu būdu.
Naudinga, siekiant atkurti įprastą žarnyno veiklą.

Vidurių užkietėjimas

Esant vidurių užkietėjimui, išmatų turinys būna kietas, tuštinimasis būna sunkus arba tuštinamasi rečiau nei 3 kartus per savaitę. Išmatų susilaikymas slėgia organizmą ir gali būti daugybės ligų bei sutrikimų priežastis.

Netinkamai gydomas užsitęsęs vidurių užkietėjimas gali sukelti psichofizinių sudirginimų, galvos, pilvo skausmą, odos problemų, žarnų nepraeinamumą, hemorijų ir išangės įtrūkimus (įplėšas odoje).

Dažniausia vidurių užkietėjimo priežastis yra susikaupusios ir nepašalintos išmatos apatinėje žarnos dalyje (vadinamojoje tiesiojoje žarnoje), ypač ten, kur tiesiosios žarnos tuštinimosi refleksas yra silpnas.

Laisvinimas ir šalinimas

Vidurių užkietėjimas, susijęs su išmatų kamščio susidarymu, turi būti šalinamas vietiskai veikiančiomis laisvinančiomis priemonėmis. **eva/q_u** žvakutė išskirdama putojančius burbuliukus skaido išmatų kamštį tiesiojoje žarnoje ir skatina greitą bei švelnų jų šalinimą.

***eva/q_u** žvakutė veikia tik vietiskai, jos sudėtyje nėra laisvinamųjų medžiagų, kurios, organizmui absorbuojamos, gali sukelti nepageidaujamą šalutinį poveikį, tokį kaip sunki dehidratacija, elektrolitų pusiausvyros sutrikimas, laisvinamųjų sukeltas kolitas ir kt.*

***eva/q_u** žvakutė nesukelia pripratimo. Vartoti tik esant poreikiui.*

Savybės

Į tiesiąją žarną įstumta **eva/q_u** žvakutė ištirpsta per kelias minutes, išskirdama daugybę mažų putojančių mikroburbuliukų, kurie spaudžia ir masažuoja tiesiosios žarnos sienelės. Ištirpusi žvakutė suminkština užsitovėjusias išmatas. Išsiskyrusių burbuliukų sukeltas dirginimas skatina išmatų atsiskyrimą ir greitą bei lengvą šalinimą. Žvakutės gali būti vartojamos ilgą laiką siekiant palaikyti gerą tuštinimosi procesą ir jį atkurti.

Indikacijos

eva/q_u žvakutės suaugusiems rekomenduojamos suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams.

eva/q_u žvakutės vaikams rekomenduojamos 2–12 metų amžiaus vaikams.

eva/q_u žvakutės tinka visų formų vidurių užkietėjimui lengvinti: tiek įprastiniam, tiek lėtiniam.

Dėl savo veiksmingumo ir švelnaus vietinio fiziologinio poveikio, ir dėl to, kad nėra dirginančių komponentų bei medžiagų, kurias absorbuoja organizmas, žvakutės yra rekomenduojamos nėštumo ir žindymo laikotarpiu, lovoje gulintiems pacientams bei neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir neurologinių sutrikimų turintiems pacientams.

eva/q_u žvakutė gali būti vartojama žarnyno ištuštinimui prieš operaciją ar diagnostinę procedūrą (pvz., chirurginę operaciją, gastroenterologinius ir urologinius tyrimus, prostatos ekografiją, rektoskopiją).

Ji bus naudinga keliaujantiems, kai netikėtai užkietėja viduriai ir yra reikalingas greitas bei efektyvus susikaupusių išmatų pašalinimas.

Labai svarbu tinkamai pasirinkti, kada ir kur atlikti šią procedūrą: nepatariama vartoti nepatogiose biure, bare, oro uoste, restoranuose ir traukiniuose.

Profilaktika. Tai gera profilaktikos priemonė, kuri nepalieka išmatų likučių tiesiojoje žarnoje. Tiesiosios žarnos higiena gali apsaugoti nuo išeinamosios angos uždegimo, įtrūkimų, hemorojus ir neoplazijos.

Kontraindikacijos

Nežinomos, netgi vartojant dažnai ir ilgą laiką bei esant hemorogijai ir vietiniams įplyšimams. Kiekviena žvakutė yra pagaminta iš natūralių ir nenuodingų medžiagų (*natrio vandenilio karbonato ir kalio bitartrato*), naudojamų kai kurių maisto produktų sudėtyje. *Polietilenglikolis* - pagalbinė medžiaga ir nešiklis, yra inertiška, nenuodinga ir odos nedirginanti medžiaga, kuri nėra absorbuojama organizme.

Rekomendacijos

Vartoti po vieną (1) žvakutę esant poreikiui.

Vartojimo metodas

Iš nepažeistos lizdinės plokštelės išimkite vieną žvakutę ir įstumkite ją visą į įšeinamąją angą (išangę). Įstūmimą palengvinsite žvakutę sudrėkindami vandeniu. Jeigu vartotojui yra išangės pažeidimų ar diagnozuotas hemorogus, rekomenduojama žvakutę įstumti prieš tai ją sutepus vazelinu, saulėgrąžų ar alyvuogių aliejumi.

Per kelias minutes žvakutė pradeda švelniai veikti žarnyno judesius. Svarbu leisti įvykti visam procesui.

Vartotojams rekomenduojama laikyti žvakutę tiesiojoje žarnoje kiek įmanoma ilgiau, net jei pradedamas jausti noras tuštintis, žvakutės laikymo metu geriau vaikščioti, nei sėdėti ar gulėti.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Dalinio tuštšinimosi ar lengvo deginimo pojūtis tiesiojoje žarnoje neturėtų gąsdinti, nes greitai dingsta. Žvakutės sudėtyje yra polietilenglikolio, kuris gali sudirginti.

*eva/qq** žvakutės rekomenduojamos esant vidurių užkietėjimui tiesiojoje žarnoje, todėl jų veiksmingumo stoka (evakuacijos) gali nurodyti kitą problemą (pvz., žarnų nepraeinamumą), tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Nenaudokite kitiems tikslams nei nurodyta.

Nenaudokite, jei žinomas padidėjęs jautrumas bet kuriai žvakutės sudedamajai daliai.

Nėra žinoma apie šalutinius poveikius, atsiradusius vartojant *eva/qq** žvakutes.

Jei Jums ar Jūsų vaikams pasireiškia specifinės reakcijos, nustokite vartoti žvakutes ir kreipkitės į gydantį gydytoją arba vaistininką.

Laikymo sąlygos

Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui (žr. ant pakuotės ar lizdinės plokštelės).

Nenaudokite žvakučių, jei pažeista lizdinė plokštelė.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

NEGALITE IŠMESTI Į KANALIZACIJĄ AR Į KONTEINERĮ SU BUITINĖMIS ATLIEKOMIS

Nesuvartotas žvakutes reikia sunaikinti pagal vietinius reikalavimus.

Sudėtis

Natrio vandenilio karbonatas, kalio bitartratas, vandenyje tirpus polietilenglikolis.

Pakuotės

*eva/qq** suaugusiesiems: 6/12 vidurius laisvinančios žvakutės, po 4,8 g / kiekviena.

*eva/qq** vaikams: 6/12 vidurius laisvinančios žvakutės, po 1,9 g / kiekviena.

*eva/qq** žvakutė – medicinos priemonė.

Gerai toleruojama ir veiksminga, natūralaus ir fiziologinio poveikio dėka galinti atkurti normalią žarnyno veiklą.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas: 2016 m. kovo mėn.

Gamintojas:

So. Se. PHARM S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 22

00071 Pomezia (Rome), Italija

www.sosepharm.com

Platintojas Lietuvoje:

UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15, Sutkūnai

LT- 76116 Šiaulių raj.

Tel.: 8 800 12 345

www.miecys.lt

