

SUDĖTIS:

Damasko rožė (*Rosa damascena*), indiškasis agrastinis lapainis (*Emblica officinalis*), dažinė ciberžolė (*Curcuma longa*), P-Plus™, hipromeliozė, SCO[®], EDTA dinatrio druska, izotoniniame buferiniame tirpale, kurio pH 7,2.

APRAŠYMAS:

NAVI[®]INFLA yra drėkinantys ir antioksidaciniai akių lašai su augaliniais ekstraktais, hipromelioze ir P-Plus™.

P-Plus™ ir hipromeliozė padeda išlaikyti akies paviršių gerai sudrėkintą ir suteptą. Tai suteikia ilgalaikį sausų akių simptomų, sąlygotų uždegimo, palengvėjimą.

NAVI[®]INFLA sudėtyje yra Damasko rožė (*Rosa damascena*), indiškasis agrastinis lapainis (*Emblica officinalis*), dažinė ciberžolė (*Curcuma longa*), pasižymintys stipriu antioksidaciniu poveikiu, palengvinančiu oksidacinio streso diskomfortą ir padedančiu sumažinti uždegiminius simptomus.

NAVI[®]INFLA sudėtyje yra „SCO[®]“ (stabilizuotas oksichloro kompleksas) – specialus konservantas, išsaugantis buteliuke esančio tirpalo sterilumą. Veikiant šviesai, „SCO[®]“ suskyla į komponentus, kurių natūraliai yra žmogaus ašarose, pavyzdžiui, natrio chloridą, deguonį ir vandenį, todėl jis gerai toleruojamas.

INDIKACIJOS:

Akių uždegiminių simptomų (pvz., paraudimo, ašarojimo ir niežėjimo), kuriuos dažnai sukelia ūminis, lėtinis ar alerginis konjunktyvitas bei oksidacinio streso (dėl taršos, vėjo, saulės poveikio, darbo kompiuteriu) gydymui.

NAVI[®]INFLA galima naudoti nešiojant visų rūšių kontaktinius lęšius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Nusiplaukite ir gerai nusauskite rankas.
- Įsitinkinkite, kad sandarus dangtelis yra nepažeistas.
- Norėdami atidaryti buteliuką, visiškai atsukite viršutinę dalį, atskirdami ją nuo apsauginės juostelės.

- Įlašinkite 1 ar 2 lašus 3-6 kartus per dieną į kiekvieną akį, pagal poreikį arba kaip pataria specialistas.
- Po naudojimo sandariai uždarykite buteliuką.

ĮSPĖJIMAI:

- Siekiant išvengti galimos taršos, saugokite, kad lašintuvo galiuku neprisiliestumėte prie bet kokio paviršiaus ar akies.
- Nenaudokite, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai daliai.
- Įlašinus preparato, nežymus akių jautrumas gali pasireikšti trumpalaikiu dilgčiojimu ar dirginimu, kuris išnyksta pamirksėjus.
- Tirpalo negalima nuryti.
- Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
- Atidarius buteliuką, tirpalą būtina sunaudoti per 30 dienų.
- Nenaudokite tirpalo, pasibaigus tinkamumo laikui.
- Jei simptomai išlieka, kreipkitės į akių gydytoją.
- Nenaudokite, jei buteliukas yra pažeistas.
- Preparatą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

LAIKYMAS:

- Laikyti 5–35 °C temperatūroje, nuo tiesioginės šviesos apsaugotoje vietoje.

3 ml (nemokamas pavyzdys) REF D3N1297

15 ml REF D15N1298



Platintojas:

UAB „MIEČYS“

Masiuliškių g. 15

Sutkūnai

LT-76116 Šiaulių raj.

Tel.: 8 800 12 345

www.miecy.lt

NOVAX[®] PHARMA

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com

CE
0051

V1 - Rev. 12/04/2019