

Xilaplus®

Xilaplus®

Numatytas naudojimas

Xilaplus vartojamas fiziologinėms žarnyno sienelių funkcijoms atkurti, siekiant kontroliuoti ir palengvinti įvairios kilmės viduriavimo simptomus (pavyzdžiui, pilvo tempimą ir dažną tuštinimąsi).

Šiame produkte esantis ksilogliukano ir želatinos derinys veikia sudarydamas plėvelę, kuri apsaugo žarnyno gleivinę ir sumažina viduriavimo epizodų dažnį bei trukmę.

Pakuotė

Kiekviename paketyje yra vaikams skirtų miltelių.

Kiekvienoje lizdinėje pakuotėje yra aštuonios suaugusiesiems skirtos kapsulės.

Sudėtis

Milteliai: ksilogliukano ir želatinos, gyvūninės kilmės (kiaulių), derinys, maltodekstrinai, citrinų rūgštis, natrio chloridas, sukralozė ir žemuogių bei vanilės kvapiosios medžiagos.

Kapsulės: ksilogliukano ir želatinos, gyvūninės kilmės (kiaulių), derinys, kukurūzų krakmolai, magnio stearatas (augalinis).

Naudojimo instrukcijos

Milteliai: paketėlio turinį išstipinkite pusėje stiklinės vandens. Be to, miltelius galima suberti į nedidelį kiekį vaisių sulčių. Gerai išmaišykite ir išgerkite nedelsiant.

Kapsulės: nurykite kapsulę užgerdami skysčiu.

Dozavimas

Jaunesniems kaip 3 metų vaikams: 1 paketėlis kas 8 valandas.

3–14 metų vaikams: 1–2 paketėliai kas 6–8 valandas.

Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 14 metų vaikams: 1–2 kapsulės kas 6–8 valandas.

Išspėjimai

- Prieš produkto vartojimą pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu nebūtina. Vis dėlto tokia konsultacija rekomenduojama,

jei simptomai yra sunkūs ar išlieka arba diagnozė kelia abejonių.

- Jei viduriavimas pasireiškia jaunesniems kaip 3 metų vaikams ar senyviems žmonėms, rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, ypač jei yra ir kitokių simptomų.
- Ši medicinos priemonė nėra farmakologinis gydymo būdas. Jei sveikatos priežiūros specialistas rekomendavo farmakologinį gydymą, kartu galima vartoti šią medicinos priemonę.
- Rekomenduojama gerti daug skysčių ir laikytis dietos reikalavimų, kurie yra taikomi viduriuojant.
- Nors duomenų apie šalutinį poveikį neturima, šio produkto nerekomenduojama vartoti nėštumo ar žindymo laikotarpiu, nebent sveikatos priežiūros specialistas nurodė kitaip.
- Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, produkto vartoti negalima.
- Jei lizdinė pakuotė ar paketėlis yra atidaryti ar pažeisti, produkto vartoti negalima.
- Šiai medicinos priemonei specialių laikymo sąlygų nereiškia. Negalima užšaldyti.
- Produktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kontraindikacijos

Xilaplus negalima vartoti, jei yra padidėjęs jautrumas ksilogliukanui, želatinai ar bet kuriai produkto sudedamajai daliai.



NOVENTURE, S.L.

Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona
Ispanija

Platintojas: UAB „Miečys“

Masiuliškių g. 15, Sutkūnai
LT-76116 Šiaulių raj.
Tel.: 8 800 12 345, www.miecys.lt



0373

Rev.05:01.09.2019